

SÍNDROME DE FREY

Cambra Quintas L, Giraldez Villar M, Lages Jorge Timoteo C, Lopez García R.

ÁMBITO

Atención Primaria



MOTIVO DE CONSULTA

Sudoración profusa en mejilla

ANAMNESIS

Cuadro de episodios de sudoración profusa en región preauricular y retroauricular derecha de 10 meses de evolución, desencadenados por movimientos masticatorios. Empeoramiento en los últimos 3 meses.

Antecedente personal de interés indicaba una parotidectomía derecha por hemangioma (2019).



EXPLORACIÓN FÍSICA

No eritema ni edema en región preauricular derecha. Buen aspecto de cicatriz de parotidectomía. No adenopatías. No dolor a la palpación en ATM. Membranas timpánicas íntegras. Pupilas isocóricas y normorreactivas. No alteración de pares craneales. No focalidad neurológica.

Analítica de sangre sin alteraciones. ECG: dentro de normalidad.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Infección herpética (no antecedente ni lesiones compatibles)

Disección ganglionar cervical (no antecedente)

Tumor de Pancoast (no otra clínica compatible con un síndrome de Claude-Bernard-Horner ni con otros síndromes asociados)

Traumatismo (no antecedente)

Incisión preauricular en contexto de intervención quirúrgica (abordaje a articulación temporomandibular, parotidectomía)

Simpatectomía torácica

Dado el antecedente de parotidectomía ipsilateral y la ausencia de otros síntomas y signos se diagnosticó un Síndrome de Frey postquirúrgico tardío.

SÍNDROME DE FREY POSTQUIRÚRGICO TARDÍO



EVOLUCIÓN Y CONCLUSIONES

El tratamiento tópico inicial más adecuado a este cuadro es el glicopirrolato (fórmula magistral), que es de dispensación hospitalaria, por lo que no nos fue posible pautarlo de forma inmediata. Se realizó interconsulta a Otorrino. Tras valoración decidieron tratamiento con inyección de toxina botulínica.

Queremos resaltar las limitaciones que encontramos al pautar determinadas medicaciones que son de ámbito hospitalario, cuando estas pueden y deben ser utilizadas desde la consulta de Atención Primaria siempre que estén indicadas, con la misma facilidad que cualquier otra medicación que pautamos habitualmente.